- נקודות לתפעול יעיל של המכשיר: LaserCvte

תחזוקה

- כל 50 בדיקות יש לבצע החלפה של: \cap
- מבחנות ניקוי פקק חום (מבחנת עודפים) ופקק צהוב (אניזמי ניקוי). מבחנות אלו מסופקות עם קיט לייזרצייט.
- יתכן מילוי של המבחנה החומה בעודפים יש לבדוק פעם בשבוע את מידת . מילוי המבחנה ולרוקנה לפני מילוי מלא.
 - תחזוקת בקבוקי הנוזלים במכשיר: 0
 - ריאגנטים (reagent sheat) שני בקבוקים זהים בערכה
- יש להחליף לבקבוק השני שסופק בערכה לפני שהריאגנט מתרוקן לגמרי. המכשיר מספק הודעה קופצת שיש להחליף את הריאגנט – אין לבצע •
 - בדיהות או Prime נוספים לפני טיפול בהחלפת הבקבוק, למניעת היווצרות בועות אוויר אשר יגרמו הסטה של אינטרפטצית המכשיר.
 - פינוי נוזלי הפסולת: 0
- במכשיר היים בהבוה פסולת שהוף המשמש לאיסוף נוזלי הבדיהה במכשיר.
- יש לבדוק פעם בשבוע את מידת מילוי בקבוק הפסולת, יש לרוקן את תכולתו למיכל ייעודי במרפאה, לפני שמתמלא לגמרי. . באחריות המרפאה לבצע פינוי של המיכל הייעודי לנוזלי הפסולת בהתאם להנחיות העדכניות הקבועות בחוק ובתקנות תאגידי המים והביוב.
 - לפי המידע העדכני לתאריך 3/5/2020, המלצת וטמרקט הינה לבצע פינוי של נוזלי הפסולת על ידי חברה מוסמכת לטיפול בפסולת רפואית מסוכנת.
 - פילטר פנימי נמצא מאחורי המגירה עם בקבוקי הנוזלים 0
 - יש לדאוג להימצאות פילטר חלופי במלאי המרפאה הזמין.
 - יש לבצע החלפה כל 2-3 חי או כשהמחשב מתריע (תדירות ההחלפה תלויה בתדירות השימוש במכשיר). .
 - ניתן ליצור קשר עם נציג אידקס בוטמרקט לתמיכה בתהליד. .
 - פילטר אבק ממוקם בקדמת המכונה בצד ימין למטה 0
 - יש לבצע ניקוי שבועי של הפילטר עייי הוצאתו, ביצוע ניקוי יסודי, והחזרתו למקום יבש ונקי.
 - יש להריץ כאשר: Prime 0
 - עברו יותר מ- 36 שעות בין בדיקות. .
 - בכל יום ראשון בשבוע טרם הרצת דגימה ראשונה של שבוע העבודה.
 - אם עברו יותר מ-5 ימים מהבדיקה האחרונה, יש להריץ Prime פעמיים.
 - ביצוע הPrime במסך הבית ללחוץ על אייקון שמאלי למטה של LaserCyte, בצד ימין ללחוץ על אופציית Lasercyte Diagnostic .Prime אלחוצ על Procedures ואז OK. בלשונית של
 - בדיקת טמפרטורה: 0

- חום תקיו לשימוש במכשיר 16-25 מעלות
- בכל תחילת פעילות יש לבדוק את טמפרטורת המכשיר. אם היא מעל 25 מעלות יש להדליק מזגו ולהמתיו לקירור המכשיר טרם השימוש בו
- ביצוע הבדיקה: במסד הבית ללחוץ על אייקון שמאלי למטה של LaserCyte, בצד ימין ללחוץ על אופציית lasercyte diagnostic OK. בלשונית של TEST – בדיקת טמפרטורה
 - את הבדיקה יש לבצע פעמיים ולהתייחס לערך השני בלבד
 - Interlink אפליקצית 0
- במרפאות שעובדות עם התוכנה, תפעול תקלות מבוצע על ידי צוות . וטמרקט.

הרצת בדיקה

- לקיחת דם במבחנה ייעודית של המכשיר (פקק סגול ונפח מילוי 0.5-1.5 מ״ל) 0
 - הכנסת מבחנות

.

- מבחנת הדגימה לודא שהפקק סגור היטב, לטעון לאחר ערבול עדין ווידוא שאין קרישים בדגימה
- מבחנה אפורה CBC5R המכילה QualiBeads מנוערת היטב (מבחנה אפורה מיועדת לבדיקה בודדת) .
 - במחשב 0
 - פתיחת תיק חיה כרגיל (שם, מספר תיק, סוג, גיל)
 - במסך הרצת הבדיקה לבחור למטה את המכשיר LaserCyte (הכי שמאלי)
 - (CatalystOne / Dx אפשר במקביל להריץ גם ביוכימיה ואז בוחרים את
 - לחיצה על RUN במחשב תתחיל את הבדיקה
 - (עבור Catalyst צריך ללחוץ גם על כפתור start על גבי צג המכשיר)



צפייה בתוצאות

- יש להדפיס את התוצאות על דף צבעוני או לצפות במסך IVLS.
- יש לשים לב לתוצאות המלוות ב-* ו/או הערת מידע מתחת לטבלת התוצאות
- יש לשים לב למיקום QualyBeads בגרף. במצבים בהם מיקומן שונה מהנורמה, ליצור קשר עם נציג וטמרקט לתמיכה



המלצת איידקס לאבחון משטח דם נלווה לדגימה:

- בכל מצב בו המכשיר מציין סימון * ליד אוכלוסית תאים או תוצאה, ו/או מלווה את הבדיקה בהערה
 - בכל מצב בו קיים ספק לגבי התאמת התוצאות לקליניקה בכלב בריא -
 - בכל מקרה בו הבדיקה משויכת לחיה שאינה מרגישה טוב -
 - בדיקה בה גרף DOT PLOT אינו אופייני

כללית, מצב יחיד בו לא קיימת המלצה ברורה לאבחון משטח במקביל לספירה הינו מצב של חיה בריאה בבדיקה שגרתית, המלווה בתוצאות ספירה תקינות.

054-2525849 מאיר רוז 054-2525665 ירון נחמיאס
054-2525665 ירון נחמיאס
054-2525671 נועם משה
054-2855420 קרין גולדברג תועמלנית וטמרקט
052-4373734 וטרינרית וטמרקט 052-4373734

דף זה נועד לתמיכה ואין בכתוב בו להחליף את המידע הכלול בספר המוצר