

7 Color: CMYK, PMS: 139, 2405, 3282
USDA Product Code: 47K1.20
Revision#: 168658 R10 CCT: 031
Card Cover Size: 8-1/16" W x 4-5/32" H
Coding Space: 3/4" W x 1-19/32" H

נוביווק® מתומן DAPPv + L4

25 X 1 מנה

לשימוש בבעלי חיים בלבד.



תרכיב המכיל רכיב מיובש בהקפאה שלאחר המסתו עם הבקטרין
הנוזלי, מתקבל תרחיף להזרקה.

Nobivac® Canine DAPPv + L4
נוביווק® מתומן DAPPv+L4



הרכב: מנה אחת של תרכיב מכילה:
נוביווק® DAPPv (Nobivac®):

Canine Distemper Virus, (CDV) Distemperoid strain $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀, Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2), Ditchfield strain $\geq 10^{4.8}$ TCID₅₀, Canine Parainfluenza (CPI), CPI-PR strain $\geq 10^{4.3}$ TCID₅₀, Canine Parvovirus (CPV), SAH-CPV-2b strain $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀,

בקטרין חיידקים מומתים (Nobivac® Lepto4):

Leptospira canicola (LC), LC-NY strain $\geq 8/10$ hamsters survive challenge, *Leptospira grippotyphosa* (LG) $\geq 8/10$ hamsters survive challenge, *Leptospira icterohaemorrhagiae* (LILI-11403 J strain) $\geq 8/10$ hamsters survive challenge, *Leptospira pomona* (LP) $\geq 8/10$ hamsters survive challenge.
TCID₅₀: 50% tissue culture infective dose.
FAID₅₀: 50% fluorescent antibody infective dose.

מכיל Gentamicin B ו- Amphotericin כחומרים משמרים.

מין מטרה: כלבים
יצרן: Intervet Inc. Omaha, USA

Nobivac™

MSD
Animal Health



Code 214953 168658 R10



Lot:
Exp:

שם היצרן וכתובתו: אינטרווט בע"מ, אומהה, אי. או. 68103 ארה"ב
שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה שאנן, הוד
השרון 4527701
09-95633375

תותי זוז נבדקה ואושרה ע"י השרותים הווטרנריים בתאריך: 11.2023
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרנריים הינו: 6-310-07-15

יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) בהזרקה תת עורית.
ניתן לתת את המנה ההתחלתית בגיל 8 שבועות ומעלה. יש לחזור על החיסון
לאחר 2-4 שבועות. דרושות 2 מנות לפחות לצורך השגת חיסוניות ראשונית.
משך החיסוניות לתרכיב לא נבדק. מומלץ לתת חיסון חוזר אחת לשנה.

מינון, דרך ואופן מתן, הוראות הכנה והנחיות לשימוש בכו:
יש להשתמש במזרקים ומחטים חדשים, שלא עברו עיקור כימי.
יש לנער את בקבוקון ה- Nobivac® Lepto4 ולהעביר את תכולתו לבקבוקון
Nobivac® DAPPv באופן אספטי. יש לערבב בעדינות עד להמסה.

אזהרה: אין לתת את התרכיב כמסחור של 25°C-8°C או להקפוא.
יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון מיד לאחר ההתמסה.
אם אין להשתמש בתרכיב לאחר תחילת ההתמסה חתום על גב האריזה.
סוג תכולת האריזה: 25 בקבוקונים ו-1 בקבוקון. סך הכל 26 Nobivac® DAPPv תכולות מתן אחת
רכיב משומש בשטח 25 בקבוקונים. ייתכן 25 בקבוקונים. סך הכל 26 Nobivac® DAPPv תכולות מתן אחת
הוא (ל) 1.

התוויה:

התרכיב נמצא כיעיל לחיסון כלבים בריאים בני 8 שבועות ומעלה כנגד חיידקי *L. grippotyphosa* - i, *L. Pomona*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* התרכיב גם נמצא כיעיל נגד תמותה ו- *leptospirosis* (הפרשה של *Leptospira* בשתן) הגורמים על ידי *L. Pomona*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. Canicola* ו- *L. grippotyphosa*. אין מידע זמין לגבי תחילת חסינות (OOI) ומשך החסינות (DOI) לאחר מתן התרכיב.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

במקרים נדירים עלולה להופיע תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס) אקוטית וחולפת. חום, עייפות, התנפחות הפנים, הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר החיסון. מידע המצביע על התפתחות עכירות הקרנית (corneal opacity) אינו קשור לשימוש בתכשיר זה.

חשוב לדווח על אירועים חריגים על מנת לאפשר ניטור על בטיחות המוצר. אם הבחנת בתופעות לוואי כלשהן שאינן רשומות בעלון או קיים החשש שהמוצר אינו יעיל אנא צור קשר עם הוטרנר המטפל או החברה. לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט בטלפון: 09-9533375.

אזהרות מיוחדות:

אזהרות לשימוש בבעלי חיים:

יש לחסן כלבים בריאים בלבד, שאינם נגועים בטפילים. שימוש בתכשיר ביולוגי עשוי לגרום לתגובה אלרגית חריפה (anaphylaxis) ו/או

168658 R10

לתגובות רגישות יתר דלקתיות אחרות במעורבות מערכת החיסון. ניתן לטפל ב- corticosteroids, Epinephrine, antihistamines ו- תלוי באופי וחומרת התגובה. הגיל, בו הנוגדנים האימהיים כנגד parvovirus אינם מפריעים יותר להשראת חיסונית פעילה, משתנה בהתאם לרמת הנוגדנים (טיטר) שמצויה בדם האם ובכמות נוגדני הקולוסטרון שהגור ספג.

נוכחות נוגדנים אימהיים ידועים כמפרעים להתפתחות חיסונית פעילה בכלבים וחסיוני דחף נוספים ידרשו עבור רוב החיות הצעירות.

אין לערבב את התרכיב המוכן או את אחד מרכיביו עם מוצר רפואי אחר. אין לתת את הבקטרין הנזל' בנפרד.

אזהרות לאדם המחוסן:

במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תויות התרכיב.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש במהלך הריון:

אין לחסן כלבות הרות.

אי התאמות ותגובות בין תרופותיות:

אין לערבב את התרכיב המוכן או את אחד מרכיביו עם מוצר רפואי אחר. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות התרכיב בשימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינרים אחרים.

מתן מנת יתר:

ללא סימנים מיוחדים.