

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד  
לשימוש בכלבים בלבד

## **נוביווק® לפטו**

### **NOBIVAC® LEPTO**

**תרכיב של חיידקי לפטוספירה, תרחיף להזרקה**

**תכולה:** 10 בקבוקונים המכילים מנה אחת.

**הרכב:**

חומר פעיל :

כל מנה (1 מ"ל) של תרכיב נוביווק לפטו מכילה חיידקי לפטוספירה אינטרוגנס (Leptospira interrogans) מומתים מהקבוצות הסרולוגיות:

<i>Canicola strain Ca-12-000</i>	≥	957 יחידות/מ"ל
<i>Icterohaemorrhagiae strain 820K</i>	≥	625 יחידות/מ"ל

**חומר משמר:** תיומרסל 0.01%

**התוויות:**

השראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים כנגד לפטוספירוזיס, הנגרמת ע"י לפטוספירה אינטרוגנס מהקבוצות הסרולוגיות קניקולה (*Canicola*) ואיקטרוהמורג'יאה (*Icterohaemorrhagiae*).

**מינון ודרך מתן:**

יש להזריק באופן תת עורי בעורף או באזור החזה נפח של 1 מ"ל לכל כלב באופן אספטי. אפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר (15-25°) טרם השימוש. יש להשתמש בצידוד הזרקה סטרילי. יש לנער היטב לפני שימוש.

**מתן חיסון ראשוני:**

כלבים שטרם חוסנו, אמורים להתחסן פעמיים במרווח של 2-4 שבועות. גורי כלבים אמורים להיות לפחות בני 8 שבועות לפני קבלת החיסון הראשוני.

**חיסון חוזר:**

מדי שנה.

**אזהרות לבעלי חיים:**

יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.

**אזהרות לאדם:**

1. לשימוש וטרינרי בלבד.
2. הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
3. המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
4. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
5. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
6. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

### **תופעות לוואי:**

מדי פעם עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה, החולפת מעצמה. תגובה עורית מקומית קטנה בגודלה עלולה להופיע במהלך הימים הראשונים שלאחר מתן החיסון.

### **שימוש במהלך הריון או הנקה :**

מותר לשימוש בכלבות הרות.

### **התאמה:**

ניתן להזריק את התרכיב Nobivac Lepto במקביל עם התרכיבים :

- Nobivac DHPPi
- Nobivac Puppy DP
- Nobivac DHP

ניתן להזריק את Nobivac Lepto באותו הזמן עם Nobivac Rabies אך באזור הזרקה שונה.

### **תגובות בין תרופתיות:**

אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה שימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינרים אחרים פרט לתכשירים המצוינים מעלה. ההחלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש בתכשירים רפואיים וטרינרים אחרים צריכה להתקבל לפי כל מקרה לגופו.

### **הוראות אחסון:**

יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

יש לאחסן את התרכיב בקירור ( $2-8^{\circ}\text{C}$ ).

אין להקפיא. יש להגן מפני אור.

יש להשתמש בבקבוקונים אשר נוקבו תוך יום עבודה אחד.

יש להיזהר ולמנוע חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות.

### **צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים**

#### **שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**

יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה.

**אריזה:** קופסא המכילה 10 בקבוקונים.

### **יצרן:**

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

### **יבואן ומשווק:**

וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם, ישראל 6085001.

טלפון: 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך : 02.2018

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו : 6-102-07-12