




Nobivac® Puppy DP PLUS

נוביווק® פאפי די פי פלוס

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף להזרקה

ב- 1 מנה/1 מ"ל:

Live attenuated *canine distemper virus* strain
Onderstepoort. $10^{5.1} - 10^{6.5}$ TCID₅₀
Live recombinant *canine parvovirus* strain 630a:
 $10^{5.1} - 10^{6.7}$ TCID₅₀*

קופסת פלסטיק המכילה 5 בקבוקוני זכוכית של
מנה אחת של תרכיב ו- 5 בקבוקוני זכוכית של
1 מ"ל ממס בהתאמה.
מין מטרה: כלבים (גורי כלבים).
דרך מתן: תת עורי.



1 X 5 מ"ל מנות



Nobivac® Puppy DP PLUS

נוביווק® פאפי די פי פלוס

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף להזרקה
עבור כלבים (גורי כלבים).

הרכב:

כל מנה (1 מ"ל) של תרכיב לאחר המסה מכילה:
Live attenuated *canine distemper virus* strain
Onderstepoort. $10^{5.1} - 10^{6.5}$ TCID₅₀
Live recombinant *canine parvovirus* strain 630a:
 $10^{5.1} - 10^{6.7}$ TCID₅₀ *
* Tissue culture infective dose 50%

מין מטרה:

כלבים (גורי כלבים).

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:
יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית לגורי כלבים מגיל
4 שבועות, לאחר המסת התרכיב עם הממס Solvent for
Nobivac® Puppy DP PLUS המצורף באריזה.

יש לוודא כי כל האבקה המיובשת בהקפאה הומסה לחלוטין
לפני השימוש.
יש לתת את כל תכולת הבקבוקון.

התוויות:

לחיסון פעיל של גורי כלבים מגיל 4 שבועות למניעת
סימנים קליניים ותמותה כתוצאה מהדבקה בנגיף *Canine*
distemper (כלבלבת) ובנגיף *Canine parvovirus*
ולמניעת הפרשה ויראלית בעקבות ההדבקה בנגיף
Canine distemper ו- *Canine parvovirus*.
תחילת החסיונות: 7 ימים ל- *canine distemper virus* ו-3
ימים ל *canine parvovirus*.
משך החסיונות: 8 שבועות.

התוויות נגד:

אין.

תופעות לוואי :

נפיחות קטנה, ללא כאבים (קוטר מקסימלי של 1 ס"מ)
באזור ההזרקה במהלך השבוע הראשון לאחר החיסון היא
תופעה שכיחה מאד. הנפיחות תיעלם לחלוטין תוך מספר
ימים. במקרים נדירים יכולה להתרחש ירידה בפעילות
במהלך 4 שעות לאחר החיסון.

תדירות תופעות הלוואי מוגדרת על פי המוסכמות הבאות:
מאד-שכיח (יותר מאחד מתוך עשרה בעלי חיים מטופלים
מפגין תופעות לוואי).

שכיח (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים בכל
100 בעלי חיים מטופלים).

לא שכיח (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים בכל
1,000 בעלי חיים מטופלים).

נדיר (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים בכל
10,000 בעלי חיים מטופלים).

מאוד נדיר (פחות מבעל חיים אחד מתוך 10,000 בעלי
חיים מטופלים, לרבות דיווחים מבודדים).

חשוב לדווח על אירועים חריגים על מנת לאפשר ניטור על
בטיחות המוצר. אם הבחנת בתופעות לוואי כלשהן אפילו

שאינן רשומות בעלון או קיים החשש שהמוצר אינו יעיל
אנא צור קשר עם החברה. לדיווח על תופעות לוואי/אירועים
חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט בטלפון:
09-9533375

זמן המתנה:

לא רלוונטי.

הוראות אחסון:

יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין לשנע מעל 30°C.
אין להקפיא. יש להגן מפני אור.
לאחר ההמסה, יש להשתמש בתרכיב המוכן תוך 30 דקות.
אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות מיוחדות:

אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
רמות בינוניות עד גבוהות של נוגדנים אימהיים כנגד נגיף *canine distemper* עלולות להפחית את יעילות התכשיר כנגד מחלת *canine distemper*.
בדרך כלל מומלץ כי כל גור יחוסן בתרכיב זה בגיל 6 שבועות. במקרים שיש סיכון גבוה להידבקות בנגיף *Canine parvovirus* או נגיף *Canine distemper* מומלץ לחסן גורים מוקדם יותר, אך לא לפני גיל 4 שבועות.
בחלק מהגורים, זן *Canine parvovirus* של התרכיב עלול להימצא בצואה עד 8 ימים לאחר החיסון. לעיתים זן התרכיב עלול להיות מופץ לכלבים וחתולים אחרים, אך אינו

גורם לסימני מחלה. בחתולים, עלולה להיות הפרשה של זן התרכיב בצואה עד 5 ימים והפצה לחתולים אחרים ללא ביטוי סימני מחלה. נגיף *Canine distemper* אינו מופץ על ידי גורים מחוסנים.

אזהרות לאדם המחסן:

במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לפנות מיד לקבלת ייעוץ רפואי ולהציג את העלון המצורף לאריזה או את התווית לרופא.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש בזמן הריון או הנקה:

בטיחות התרכיב במהלך הריון לא נבדקה.

תגובות בין תרופתיות:

קיימים נתוני בטיחות המעידים כי תרכיב זה יכול להינתן באותו היום, אבל לא מעורבב, עם תרכיב מסדרת נוביווק המכיל *Bordetella bronchiseptica* ו-*canine parainfluenza virus* במתן לתוך האף (Nobivac KC).
היעילות לאחר שימוש בו-זמנית טרם נבדקה. לכן, למרות שהודגמה בטיחות בשימוש בו-זמנית, על הווטרינר לקחת זאת בחשבון כאשר הוא מחליט לתת תכשירים אלו באותו הזמן.

לא קיים מידע על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה כאשר הוא ניתן עם כל תכשיר רפואי ווטרינרי אחר למעט זה שצוין לעיל. לאור זאת, יש לקבל החלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי כל תכשיר רפואי ווטרינרי אחר על בסיס כל מקרה לגופו.

מינון יתר:

לא נצפו תופעות לוואי לאחר מתן התרכיב במינון יתר של פי 10 למעט אלו שצוינו בסעיף תופעות לוואי.

אי התאמות עיקריות:

אין לערבב את התרכיב עם תכשיר רפואי וטרינרי אחר, למעט הממס המסופק יחד עם התרכיב באותה האריזה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה:

קופסת פלסטיק המכילה 5 או 25 בקבוקוני זכוכית של מנה אחת של תרכיב ו- 5 או 25 בקבוקוני זכוכית המכילים 1 מ"ל ממס בהתאמה.
לא כל גדלי האריזה משווקים.

מידע נוסף:

נוגדנים אימהיים כנגד *canine parvovirus* אינם מפריעים ליעילות התרכיב. החסיונות כנגד *canine distemper virus* מושגת בגורים בני 4 שבועות בעלי רמות נמוכות עד בינוניות של נוגדנים אימהיים.

שם היצרן וכתובתו:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat
35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

שם בעל הרישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון
4527701.
טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך:
11.2023

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו: 6-311-07-15