

## לשימוש וטרינרי בלבד

שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים

לשימוש חיצוני בבעלי חיים בלבד

TAKTIC™

**טקטיק**



הרכב: חומר פעיל: אמטראז 12.5%  
נפח: 100 מ"ל, 250 מ"ל, 1 ליטר או 5 ליטר.

קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר.  
לא לשימוש ביתי  
ברישיון השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות. מס' רישום 1330.

### התוויות:

טקטיק 12.5%, תחליב מרוכז לשימוש:  
בחזירים: הדברה ומניעה של גרב (sarcoptic mange) וכינים.  
בבקר: הדברה ומניעה של קרציות, קרדיות (mange mites) וכינים.  
בכבשים: הדברה ומניעה של קרציות, קרדיות (mange mites), זבובי צאן טפיליים וכינים.  
במבנים ריקים המיועדים למגורי חזירים.

### אזהרות לאדם:



- התכשיר דליק!!
- התכשיר מזיק בבליעה.
- גורם לנזק חמור בעיניים.
- עלול להיות קטלני אם נבלע ונכנס לדרכי הנשימה.
- גורם נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חוזרת
- התכשיר עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
- התכשיר חשוד כמסרטן.

### אמצעי בטיחות ומיגון:

- שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים. אסור ליישום בידי ילדים.
- אין לשאוף את אדי התכשיר.
- המנע ממגע עם הפה, העור והעיניים.
- אין לשתות, לאכול או לעשן בכל מגע עם התכשיר.
- בכל שלבי העבודה עם התכשיר (הכנת התכשיר, ריסוס/טבילה של בע"ח, ניקוי מיכלים ריקים) יש להצטייד בביגוד נוגד מים, כולל מכנסיים, מגפי גומי, כפפות מגומי עבה (0.5 מ"מ נאופרן או ניטריל) (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK P2.
- יש ליישם את התכשיר באזור מאוורר היטב, רצוי באוויר הפתוח.

- אין לבוא במגע עם בעלי החיים ללא ביגוד מגן עד לייבוש מלא של הפרווה/צמר.
- לאחר השימוש : יש לרחוץ היטב במים וסבון את הידיים העיניים וכל שטח עור שהיה במגע עם התכשיר. רחץ את כל ביגוד המגן במיוחד פנים הכפפות.

### סיכונים לסביבה:



- התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, בעל השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
- יש למנוע הגעת התכשיר ותשטיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז.

### אזהרות לשימוש בבע"ח:

- אין להשתמש במקרה של רגישות ידועה לחומר הפעיל או לכל אחד מהחומרים הבלתי פעילים.
- אין להשתמש בכבשים המייצרות חלב לצריכת בני אדם.
- אין להשתמש על חיות צמאות או עייפות.
- ליישום חיצוני בלבד.
- אסור ליישום על סוסים.

### הוראות שימוש:

יש להשתמש בתכשיר בריסוס בבקר ובחזירים ובטבילה בכבשים. שימוש בתכשיר על גבי פרות נחלבות ייעשה לאחר מיצוי אפשרויות הדברה אחרות, שזמני ההמתנה המתחייבים בהם קצרים מארבעה ימים. עם הזמן, עשויה להופיע עכירות בתכשיר, אך אין לכך השפעה על בטיחות או יעילות התכשיר. בתום הטיפול יש להעביר את יתרת תכולת אמבט הטבילה ושאריותיו להשמדה במשרפה ברמת חובב.

### מינונים ודרך המתן:

#### חזירים:

הכן תמיסה לריסוס מערבוב של 40 מ"ל טקטיק על כל 10 ליטר מים. יש לערבב היטב עד קבלת תמיסה אחידה. יש להכין את התרסיס ביום הטיפול ולהשתמש במים באיכות מי שתיה. יש להוציא את המזון מכלי ההאכלה ולכסות את קערות השתייה, להוציא את המצע ולנקות את הדיר/מכלאות. יש לטפל בכל בעלי החיים אשר בקבוצה באותו הזמן, יש לרסס את כל גוף החיה עד נגירה, תוך דגש על האוזניים, המפשעה ובין הרגליים הקדמיות. אין להסיר גלדים טרם היישום. ניתן להשתמש בתכשיר גם למבנים ריקים: יש לערבב 80 מ"ל טקטיק עם 10 ליטר מים.

#### תוכנית מניעה מומלצת :

בתחילה טפל בכל העדר בתכשיר טקטיק. חזור על הטיפול לאחר 7-10 ימים. טפל באופן שיגרת ל מניעה באופן הבא :

<u>בע"ח:</u>	<u>תדירות היישום המומלצת:</u>
חזירים להרבעה	טיפול באופן שיגרת כל 2-3 חודשים
חזירות מבכירות	חזירות מבכירות
גורי חזירים	טיפול לאחר גמילה או לפני העברתם לחזירה
חזירים חדשים בעדר	לשים בבידוד ולטפל לפני הכניסה לעדר
עבור מבני מגורי חזירים	לחטא מבנים ריקים, יש לערבב 80 מ"ל טקטיק עם 10 ליטר מים.

## בקר :

הכ תמיסה לריסוס מערבוב של 20 מ"ל טקטיק על כל 10 ליטר מים. יש להכין את התרסיס ביום הטיפול ולהשתמש במים באיכות מי שתיה. רסס כל חיה לפי גודלה ומשקלה בכמות של 5-10 ליטרים של תרסיס, רסס את כל גוף החיה עד נגירה באופן מלא. במקרים חמורים של הדבקה בכינים וקרדיות, חזור על הטיפול לאחר 7-10 ימים. חזור על הטיפול כל 2-3 חודשים בכדי לשמור על העדר נקי מטפילים. טפל בכל החיות בקבוצה גם אם אין טפילים נראים לעין. למניעת קרציות יש לטפל בבקר כל 9-10 ימים במהלך תקופת הסיכון.

## כבשים :

כנגד קרציות, קרדיות, כינים וזבובים כולל מחלות עור טפיליות (sheep scab) יש לטפל בכל הכבשים בקבוצת הסיכון. ניתן לחזור על הטיפול לאחר 14 ימים באם מופיעים סימנים לטפילים. לטקטיק אין ריח חריף, ואינו גורם לדחיית של הטלאים ע"י האימהות.

טיפול יחיד ישמיד קרציות ויספק הגנה כנגד הדבקה מחדש עד ל- 6 שבועות.

**הכנת מינון התחלתי לטבילה:** יש לערבב יחס של 1 ליטר של טקטיק עם כל 250 ליטר מים באיכות מי שתיה. ליצירת תמיסה בריכוז של 0.05% .

**הכנת תוספת :** יש לערבב 1.5 ליטר של טקטיק עם 250 ליטר מים באיכות מי שתיה. ולהוסיף לתמיסה המקורית לפני שירד נפחה ב- 10%.

אופן ההכנה: הכן את התמיסה לטבילה ביום היישום, מלא את אמבט הטבילה במים באיכות מי שתיה והוסף את כמות הטקטיק המפורטת לעיל, ערבב היטב ליצירת תמיסה אחידה. יש להשליך את התמיסה בסיום היישום לפי סעיף "טיפול באריזות ריקות: בתום היישום" המפורט בהמשך העלון.

**נדירות היישום :** יש לטבול כבשים בוגרות לפני חשיפתם לאיזור נגוע בקרציות. כבשים צעירות ניתן לטבול לפני העברתן לאיזור נגוע בקרציות.

ניתן לטבול טלאים בבטחה מיום 3-4 לחייהם, מומלץ לחזור על הטבילה לאחר 3-4 שבועות, מכיוון שהצמר העדין שלהם אינו מסוגל לשמר את התכשיר באופן ממושך. יש לאפשר לכבשים מנוחה ושתיית מים מספקת לפני הטבילה. יש לטבול את הכבשים בתמיסה למשך 60 שניות, כולל טבילת הראש לפחות פעם אחת.

## **זמני המתנה:**

בשר בקר למאכל : 4 ימים.

בשר כבש למאכל: 24 ימים.

בשר חזיר למאכל : 1 ימים.

חלב בקר : 4 ימים.

חלב כבשים : אין להשתמש בכבשים המייצרות חלב לצריכת בני אדם.

## **תופעות לוואי :**

במקרה של מינון יתר בשוגג יתכנו סימנים של טשטוש. בדרך כלל ניתן לצפות להחלמה טבעית, ללא התערבות קלינית, אך במידת הצורך, יש לתת טיפול תומך עד שהתסמינים ישכחו.

## **שימוש במהלך הריון או הנקה:**

מותר ליישום על בעלי חיים בתקופת ההיריון/הנקה

## הוראות אחסנה:

- יש לאחסן בטמפ' מתחת ל 25°C (טמפרטורת החדר).
- יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
- הרחק מכל מקור מזון של בע"ח.
- הרחק ממקור אש או חום.
- המנע מהקפאה.

## טיפול באריזות ריקות: בתום היישום:

את האריזה הריקה יש לשטוף היטב במים, לפחות שלוש פעמים, ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס. נקב את האריזה הריקה או מעך. הכנס את האריזות הריקות לתוך שקית ניילון אטומה והשלך לאשפה. אין לעשות שימוש חוזר במכלים הריקים.

**חיי מדף:** באריזה סגורה ללא פתיחה: 2 שנים.

חיי מדף לאחר פתיחת האריזה : 8 שבועות.

חיי מדף לאחר ערבוב התכשיר במים : 12 שעות.

## עזרה ראשונה ומידע לרופא:

עזרה ראשונה	
מגע עם העיניים	• שטוף במיידית בהרבה מים זורמים. אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר אותן לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך 15 דקות לפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי
מגע עם העור	• במקרה של מגע עם העור בזמן לבישת ביגוד מגן, הסר בזהירות כל ביגוד שנחשף לתכשיר, כולל נעליים. שטוף באופן מידי עור חשוף עם מים זורמים וסבון, במידה והגירוי ממשיך פנה ליעוץ רפואי
בשאיפה	• פנה את הנפגע לאיזור מאוורר ופתוח. במידה ויש קשיי נשימה – פנה לטיפול רפואי מידי.
בבליעה	• אין לגרום להקאה. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה. באם הנפגע בהכרה שטוף את הפה במים ושתה כוס מים.

במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

המרכז הארצי למידע ליעוץ רפואי בהרעלות בית החולים רמב"ם, חיפה טל: 04-7771900

מידע לרופא : אמטרוז אינו תרכובת של אורגנופוספטים. בחשד בהרעלה הטיפול המומלץ הוא סימפטומטי ותומך, ולשים לב במיוחד לניטור מערכת הנשימה ותפקוד לבבי. ההחלמה היא באופן נורמלי ספונטנית. אין להשתמש באטרופין. אין לעורר הקאה.

**היצרן :** INTERVET INTERNATIONAL BV מיוצר בצרפת

**ייבוא ושיווק:** ווטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085000. טלפון 03-9393000

השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית, עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק"