

רכז אנזימי לבלב **PANZQUIN®**

Panzquin® משלב את היתרונות של אנזימי לבלב יחד עם קובאלמין (B12).

« מספק אנזימי לבלב לתמיכה בעיכול חלבונים, פחמימות ושומנים מהמזון

« תומך ברמות ויטמין B12

« מכיל סיבי פרה-ביוטיקה



**מכיל סיבי
פרה-ביוטיקה**



בחרו ב-PANZQUIN® למען המטופלים שלכם

"מחקר הראה כי 82% מהכלבים הזקוקים לתוספת אנזימי לבלב יפיקו תועלת גם מתוספת קובאלמין. מחקרים דומים בחתולים הראו כי גם במרבית החתולים הזקוקים לתוספת אנזימי לבלב, תתקבל תועלת מתוספת קובאלמין."¹

מתן אוראלי של קובאלמין הינו בעל זמינות ביולוגית. התוסף Cobalequin® הוכח בשני מחקרים שפורסמו כמסייע להעלאת רמות קובאלמין בסרום בכלבים ובחתולים.

"היפוקובאלמינמיה הודגמה כגורם הסיכון העצמאי היחיד לתוצאות קליניות לא מספקות בכלבים הזקוקים לתוספת אנזימי לבלב. מחקר הראה כי כלבים ללא היפוקובאלמינמיה יכולים לשרוד כמעט 4 שנים יותר מאשר אלו עם היפוקובאלמינמיה."¹

¹ Jörg M. Steiner, med.vet., Dr.med.vet., PhD, DACVIM, DECVIM-CA, AGAF

רכיבים והוראות השימוש

יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש המלאות הנמצאות על המוצר טרם השימוש. המידע בעלון נועד להנחייה כללית בלבד.



הרכב האנזימים

כל 2.8 גרם (כפית סטנדרטית) של Panzquin® מכילים כמות מינימלית של:

ליפאז..... 71,400 יחידות USP

פרוטאז..... 388,000 יחידות USP

אמילאז..... 460,000 יחידות USP

בנוסף

אינולין - סיבי פרה-ביוטיקה

ציאנוקובאלמין - ויטמין B12..... 500 µg

הרכיב הפעיל ב-COBALAMIN¹²



כמות ממוצעת למתן בכל ארוחה:
(גודל כפית המדידה המצורפת
למוצר = ¼ כפית סטנדרטית)

עבור חתולים

תוספת לכל ארוחה: ¼-¾ כפית סטנדרטית
(1-3 כפיות מדידה מלאות)



עבור כלבים

תוספת לכל ארוחה: 1-¾ כפית סטנדרטית
(3-4 כפיות מדידה מלאות)



יש לערבב ביסודיות את אבקת התוסף עם מזון חיות המכמד כ- 20 דקות לפני מתן הארוחה. על מזון חיות המכמד להיות לח ובטמפרטורת החדר.

ברגע שהושגה התגובה הרצויה לתוסף וצואת החיה המטופלת תקינה, השתמשו בכפית המדידה והפחיתו את הכמות בחצי כפית מדידה (1/8 כפית סטנדרטית). עקבו אחר תגובת החיה המטופלת ואיכות הצואה. במידה והצואה הופכת רכה יותר, העלו את כמות התוסף בכל ארוחה לכמות הקודמת.

לאחר שבוע, במידה והצואה עדיין תקינה, נסו שוב להפחית את כמות התוסף בחצי כפית מדידה (1/8 כפית סטנדרטית). חזרו על תהליך ההפחתה וההמתנה להתייצבות עד להגעה למינון המינימלי המתאים לייצוב חיות המכמד. התמידו במתן המינון שנמצא כמתאים והמשיכו להגיש את התוסף לחיה בכל ארוחה.